

PDS-10L, ROZTWÓR DO DEKONTAMINACJI DNA/RNA, KANISTER 10 L



OPIS OGÓLNY

Kontaminacja jest szczególnie problematyczna w bardzo czułej metodzie PCR. Pochodzący z aerozólów zanieczyszczający DNA może prowadzić do krzyżowego zakażenia, co skutkuje niedokładnymi danymi i w rezultacie błędnie zinterpretowanymi wynikami analizy.

Roztwór PDS-250 dostępny jest również w 10 litrowych pojemnikach - **PDS-10L**, co umożliwia wygodne napełnianie mniejszych butelek z dozownikiem w sprayu.

PDS jest gotowym do użycia roztworem do usuwania DNA i RNA z powierzchni w czasie przygotowywania reakcji PCR. DNA/RNA usuwa się w ciągu kilku sekund po użyciu. Roztwór zawiera środek powierzchniowo czynny oraz środek niealkaliczny i nierakotwórczy. **PDS** jest przeznaczony do stosowania w komorach PCR i komorach laminarnych (np. UVT-S-AR), urządzeniach laboratoryjnych – BioMagPure 12, TS-100, pipetach itp. Zastosowanie PDS zarówno przed, jak i po analizie PCR, jest szybkie, łatwe i idealne do utrzymania czystego obszaru roboczego, a tym samym oszczędza czas i pieniądze.

PDS jest gotowy do użycia, odporny na ciepło i stabilny przez kilka lat.

Zalecane użycie: do stosowania tylko w badaniach i przemyśle. Nie zalecane do zastosowań klinicznych. Użyj zgodnie z zaleceniami. **PDS** powinien być наносzony na szkło, ceramikę, plastik, gumę, stal i stal nierdzewną. PDS nie może być używany do oczyszczania metali lekkich lub metali nieżelaznych. Aby uniknąć uszkodzenia lub przebarwień, przed użyciem należy sprawdzić reakcję na małej, niewidocznej powierzchni.

MODELE

- **PDS-10L**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl